

Avertissements[®] agricoles

POITOU
CHARENTES 

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION GRANDES CULTURES

BULLETIN N°66 (4/85) du 6 MARS 1985

TOUTES CULTURES : CAMPAGNOLS DES CHAMPS

En dehors des secteurs d'Aulnay, Surgères et de la zone : Lezay - Chaunay Lusignan - Rom - Couhé, où subsistent quelques campagnols âgés, nés en Juillet et Août 1984 les populations actuelles proviennent de la reproduction d'automne (Septembre, Octobre, Novembre) qui s'est maintenu en Décembre-Janvier en raison des conditions climatiques favorables. En effet les indices de reproduction ont atteint des chiffres importants en Décembre et Janvier : 40 à 50 % pour les mâles et 15 à 40% pour les femelles.

Bien que le niveau des populations soit dans l'ensemble assez faible, des **risques de pullulations localisées sont à craindre** dans certains secteurs où la reproduction a été confirmée et/ou les animaux ont atteint un niveau assez important.

On trouvera ci-dessous les secteurs d'observation ainsi que les Communes où ont été pratiqués les piègeages. Mais les observations s'appliquent au secteur tout entier.

SECTEURS A RISQUES IMPORTANTS

. VILLIERS-ECHIRE (79)

(Coulonges-sur-l'Autize, Faye-sur-Ardin, Cherveux, Niort, Villiers-en-Plaine)
Les campagnols sont présents, de façon assez régulière dans les refuges, les prairies ainsi que dans les cultures fourragères: des dégâts assez importants en foyers ont pu être observés. Les pénétrations dans les jeunes semis d'automne sont rares. Il convient toutefois d'être particulièrement vigilant et d'intervenir au niveau des foyers très infestés.

. ARCHIGNY (86)

(Archigny, Leigné-les-Bois, Chenevelles, Monthoiron, Pleumartin).
Densités importantes dans tous les milieux. Si les infestations demeurent localisés dans les jeunes semis d'automne, elles sont par contre très nombreuses en prairies naturelles et artificielles (principalement vers Leigné-les-Bois, Archigny et la Petite Chaussée) et en refuges. Les populations actuelles sont dans l'ensemble jeunes mais le niveau de reproduction est très faible. Surveillez attentivement les cultures fourragères.

SECTEURS A RISQUES MOYENS

. LUSIGNAN (79-86)

(Lusignan, Rouillé, Thorigné, Rom, Mirebazin)

La majeure partie des animaux a été capturée dans les prairies âgées et les refuges. Quelques pénétrations existent en colzas et en jeunes Ray-grass mais elles demeurent très limitées. Restez vigilants aux abords de prairies.

P.I.F.



SERVICE DE LA PROTECTION
DES VÉGÉTAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS
Tél. : (49) 58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : R. GUILLEMENET
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel : **100 F.**
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

. **RUFFEC (16)**

(La Faye, Courcôme, Tuzie, Villegats, Salles de Villefagnan, Lonnes, Chenon).

Présence régulière de campagnols dans les prairies, principalement dans les jeunes ray-grass et les luzernes. Bien que les pénétrations soient peu importantes dans les semis d'automne, des dégâts sont à craindre cependant à proximité des prairies.

. **SAUZE-VAUSSAIS-GENCAY (79-86)**

(Vançais, Caunay, Sauzé-Vaussais, Saint Saviol, Brux)

Densités assez élevées en prairies et refuges (notamment vers Chaunay et Caunay). Pénétrations faibles mais constantes dans les céréales.

. **LEZAY-CHAUNAY (79-86)**

(Vançais, Lezay, Sauzé-Vaussais, Limalonges, Blanzay, Rom)

La situation est comparable à celle observée sur le précédent secteur. Compte tenu de l'âge des animaux (plus de 90 % des individus sont nés depuis Septembre) ainsi que du niveau de reproduction (élevé pour l'époque de piégeage), attention aux cultures avoisinant bernes et prairies infestées.

. **SURGERES (17)**

(Saint Félix, Doeil-sur-le Mignon, Thorigny, Saint Pierre d'Amilly). Bien que les infestations soient assez importantes en prairies et refuges, l'activité des animaux demeure plutôt limitée, malgré un redémarrage de la reproduction en Février. Quelques risques localisés.

AUTRES SECTEURS

. **AIFFRES - CHIZE (79)**

(Aiffres, Celles-sur-Belle, Chizé, Fors)

. **BEAUVOIR -COIVERT (79-86)**

(Marigny, Beauvoir, Saint Séverin, Coivert, Villeneuve-la-Comtesse, La Charrière).

. **USSEAU (79)**

(Mauzé, Epannes, Prin-Deyrançon, La Faye-Montjault, Usseau).

. **THOUARS-AIRVAULT (79)**

Thouars, Pas-de-Jeu, Saint Jouin de Marnes, Availles-Thouarsais)

. **AULNAY (17)**

(Dampierre-sur-Boutonne, Néré, Chives, Saleignes, La Villedieu)

. **SAINT AMAND DE BOIXE (16)**

(Vars, Vouharte, Xambes, La Chapelle, Genac, Coulonges).

Dans les secteurs à RISQUES IMPORTANTS

(dangers de pullulation généralisés)

et dans les secteurs à RISQUES MOYENS

(dangers de pullulation localisés)

SURVEILLEZ attentivement.

INTERVENEZ rapidement si

cela s'avère nécessaire

Pour les AUTRES SECTEURS

(peu ou pas de risques)

Restez toutefois

vigilants.